




ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ІНСУЛЬТІ



Симптоми інсульту

1




Раптова слабкість у м'язах, оніміння кінцівки, м'язів обличчя або однієї половини тіла

2



Сильний головний біль

3



Порушення зору та слуху

4



Розлад мовлення. Сплутаність свідомості

5



Нестійка хода, раптова втрата рівноваги. Слинотеча й утруднене ковтання

Якщо сумніваєтеся, що у потерпілого інсульт, попросіть його



Підняти вгору обидві руки. При інсульті це зробити неможливо!



Повторити за вами елементарну фразу — наприклад: «Сьогодні видався морозний день». Хворий спотворить цю фразу або навіть не зможе її вимовити




Висунути язика — він буде скошеним набік або викривленим. Усмішка хворого також буде кривою

Переконалися, що у працівника інсульт?

Тоді негайно викличте бригаду екстреної медичної допомоги та поінформуйте диспетчера про ваші підозри щодо причини розладу здоров'я потерпілого.



ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ІНСУЛЬТІ



Якщо потерпілий у свідомості

- Покладіть його так, щоб голова та плечі розташувалися вище тіла
- Уникайте пересування хворого
- Забезпечте вільне дихання
- Не давайте їсти та пити
- Не давайте ліків
- Очистіть ротovu порожнину
- Вимірюйте пульс і тиск кожні 10 хвилин

Якщо потерпілий без свідомості, але дихає

Перемістіть його в безпечне положення. Хворий має лежати на боці з підкладеною під голову рукою. Голова при цьому має бути нахиленою вперед, а нога — зігнутою в коліні

Якщо потерпілий не дихає

Негайно розпочніть серцево-легеневу реанімацію

При інсульті НЕ можна

1



Приводити до тями хворого нашатирним спиртом

2



Різко знижувати тиск за допомогою медичних препаратів.
Давати ліки, які розширюють судини, — нош-пу, папаверин

3



Давати їсти та пити

4



Дозволяти хворому вставати. Вірити йому, якщо він запевняє, що його стан поліпшився